

NIORD®

INSECTICIDA

GRANULADO [GR]

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN:

Teflutrin 5 g/kg (0,5% p/p)

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el nº 17.502

CARACTERÍSTICAS:

El NIORD® es un insecticida granulado. Insecticida de contacto para uso profesional en cultivos al aire con incorporación al suelo mediante tractor con equipo dispensador.

APLICACIONES AUTORIZADAS DOSIS Y METODO DE EMPLEO

Plaga	Cultivo	Momento aplicación	Dosis	Nº Aplic. (intervalo)	PS (días)
Para el control de insectos del suelo ("gusanos del alambre" (<i>Agriotes spp.</i>), "gusanos grises" (<i>Agrotis spp.</i>), "pulguilla" (<i>Chaetocnema tibialis</i>), "falsa potra" (<i>Ceuthorrhynchus pleurostigma</i>), "mosca de la cebolla, de los sembrados y de la col" (<i>Delia spp.</i>), "mosca de la zanahoria" (<i>Psila rosae</i>), "típula" (<i>Tipula spp.</i>), "gusano blanco" (<i>Melolontha melolontha</i>), "milpiés" y "ciempiés")	Algodonero, girasol, guisante verde, haba verde, hortalizas del género Brassica (brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col y coles de China), judía verde, maíz (también maíz dulce), nabo, rábano, tabaco, tomate y zanahoria	Aplicar antes o durante la siembra	10-15 kg/ha	1	NP
	Apio, berenjena, colinabo, lechugas y similares	Aplicar antes o durante la siembra	15-20 kg/ha	1	NP
	Hinojo	Aplicar durante la siembra	15-20 kg/ha	1	NP
	Melón y sandía	Aplicar antes o durante la siembra	15 kg/ha	1	NP
Para el control de insectos del suelo ("gusanos del alambre" (<i>Agriotes spp.</i>), "gusanos grises" (<i>Agrotis spp.</i>), "pulguilla" (<i>Chaetocnema tibialis</i>) y "mosca de la cebolla, de los sembrados y de la col" (<i>Delia spp.</i>)	Soja	Aplicar durante la siembra	12-15 kg/ha	1	NP
Para el control de insectos del suelo ("gusanos del alambre" (<i>Agriotes spp.</i>), "gusanos grises" (<i>Agrotis spp.</i>), "diabrotica" (<i>Diabrotica spp.</i>), "escutigera" (<i>Scutigerella immaculata</i>), "típula" (<i>Tipula spp.</i>) y "mosca de la cebolla, de los sembrados y de la col" (<i>Delia spp.</i>)	Sorgo	Aplicar durante la siembra	12-15 kg/ha	1	NP
Para el control de insectos del suelo ("pulguilla" (<i>Chaetocnema tibialis</i>) y "maripaca" (<i>Aubeonymus mariaefranciscasae</i>).	Remolacha azucarera	Aplicar antes o durante la siembra	10-15 kg/ha (para el control de pulguilla) o 20 kg/ha (para el control de maripaca)	1	NP

PS – Plazo seguridad. NP – No procede

* Antes de utilizar el producto léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

* Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según IRAC. Grupo 3A, insecticida.



MITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial de:

- 10 m con cubierta vegetal para hortalizas del género Brassica (brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, col, coles de china), lechuga y similares, berenjena, tomate, sandía, melón;
- 10 m con cubierta vegetal o 20 m sin cubierta para zanahoria, rábano, nabo, colinabo, hinojo, apio;
- 10 m para judía verde, haba verde, remolacha azucarera, girasol, tabaco, soja;
- 5 m para maíz, maíz dulce, sorgo, algodón, guisante verde.

Para proteger los artrópodos no objetivo, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta la zona no cultivada de:
- 5 m para todos los cultivos (para proteger a las abejas).

Para proteger las aves y los mamíferos silvestres, el producto debe incorporarse completamente al suelo, recójase todo derrame accidental.

Para proteger a las abejas, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo, retírense las colmenas durante el tratamiento, no aplicar cuando las malas hierbas estén en floración o elimínense las malas hierbas antes de su floración, no aplicar durante los 10 días previos a la floración.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON SU PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o caminos).

OBSERVACIONES

No se autoriza el uso en superficie, el producto solamente podrá ser aplicado enterrado en el suelo.

No aplicar el producto con existencia de viento en la zona para evitar riesgo en abejas.

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.) La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

3X08ATM. Revisión n 2, de fecha 31-01-2022.

